

?

Fitosfingozyna jest naturalnym składnikiem naskórka, zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu.



Wzmacnia i odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry.




Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.




Łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Natłuszcza i nawilża skórę.

Skóra podrażniona



Skóra odbudowana



ZADZWOŃ I ZAMÓW —
+48 62 753 04 47



eurowet.pl



sprzedaz@eurowet.pl



[/eurowet](https://www.facebook.com/eurowet)



[/eurowetfirma](https://twitter.com/eurowetfirma)

EUROWET

Od 25 lat jesteśmy producentem i dystrybutorem preparatów dla zwierząt towarzyszących. Naszą misją jest troska o zdrowie zwierząt.

EUROWET

spot-on
SEBOSTOP

PREPARAT PRZECIW ŁOJOTOKOWI
Z FITOSFINGOZYNĄ

WSPOMAGA ZWALCZAĆ STANY KERATO-
ŁOJOTOKOWE SKÓRY OGÓLNE I MIEJSCOWE
USUWA NADMIAR WOSKOWINY W PRZEWODZIE
SŁUCHOWYM ZEWNĘTRZNYM
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH SKÓRY



spot-on SEBOSTOP

PREPARAT PRZECIW ŁOJOTOKOWI Z FITOSFINGOZYNĄ

WSPOMAGA ZWALCZAĆ STANY KERATO-ŁOJOTOKOWE SKÓRY OGÓLNE I MIEJSCOWE
USUWA NADMIAR WOSKOWINY W PRZEWODZIE SŁUCHOWYM ZEWNĘTRZNYM
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH SKÓRY

Sebostop spot-on jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie przystosowanym dla psów i kotów z objawami łojotoku. Fitosfingozyna pozwala na odbudowę warstwy rogowej naskórka, zmniejszenie łojotoku oraz reguluje mikroflorę naskórka. Pozostałe składniki preparatu chronią skórę przed odwodnieniem i łagodzą jej podrażnienia.



Stosowanie:

Wspomagająco w połączeniu z szamponami przeciwłojotokowymi **SEBOVET CLEAN** lub **SEBOVET excellence**:

Uogólniony zespół kerato-łojotokowy:

Po odsunięciu sierści zwierzęcia należy nanieść zawartość pipety na skórę w 2 lub 3 miejsca (w okolicy międzyłopatkowej i łędźwiowej):

m.c. < 20kg	1 pipeta	1 raz w tyg. przez 4 tyg.
m.c. 20-45 kg	2 pipety	
m.c. > 45 kg	3 pipety	

Miejscowy zespół kerato-łojotokowy:

Nanieść na skórę w okolicy zmian.

1 pipeta	1 raz w tyg.	przez 4 tyg.
----------	--------------	--------------

Powstawanie nieprzyjemnego zapachu:

Stosować jak przy uogólnionym zespole kerato-łojotokowym

Nadmiar woskowiny w zewnętrznym przewodzie słuchowym:

1/2 pipety do każdego ucha	2 razy w tyg.	przez 3 tyg.
----------------------------	---------------	--------------

Środki ostrożności:

Unikać kontaktu z oczami.

Skład wg INCI:

Ethoxydiglycol, PVP, Polyglyceryl-4 Caprate, Phytosphingosine